

70枚の写真で学ぶ

在宅で診る皮膚疾患の基礎知識

袋 秀平 (ふくろ皮膚科クリニック)

本コンテンツはハイブリッド版です。PDF だけでなくスマホ等でも読みやすい HTML 版も併せてご利用いただけます。

▶HTML 版のご利用に当たっては、PDF データダウンロード後に弊社よりメールにてお知らせするシリアルナンバーが必要です。

▶シリアルナンバー付きのメールはご購入から 3 営業日以内にお送り致します。

▶弊社サイトでの無料会員登録後、シリアルナンバーを入力することで HTML 版をご利用いただけます。登録手続きの詳細は <https://www.jmedj.co.jp/page/resistration01/> をご参照ください。

▶登録手続

1. 疥癬 ————— p2
2. 湿疹・皮膚炎 ————— p10
3. 真菌症 ————— p13
4. 褥瘡 ————— p20
5. フットケア ————— p25
6. 糖尿病性足病変 ————— p29
7. 皮膚悪性腫瘍 ————— p32
8. 水疱性類天疱瘡 ————— p33

▶HTML版を読む

日本医事新報社では、Web オリジナルコンテンツを制作・販売しています。

▶Webコンテンツ一覧

このコンテンツを読んでワカルこと・デキルこと

- ▶在宅における皮膚診療の基本がワカル・デキル
- ▶在宅で発症しやすい皮膚疾患の鑑別診断がデキル
- ▶在宅における皮膚疾患の治療と予防のコツがワカル・デキル

I. 疥癬



図1 ヒゼンダニの成虫

成虫は前脚・後脚ともに2対、幼虫は後脚が1対

疥癬とはヒト皮膚角質層に寄生するヒゼンダニの感染により発症し、ヒゼンダニの虫体、糞、脱皮殻などに対するアレルギー反応による皮膚病変と瘙痒を主症状とする感染症である¹⁾。

症状

▶ 激しい痒み「夜も眠れないくらい」

— アレルギー反応による痒みである。

— 免疫低下を起こしている角化型疥癬では、アレルギーを起こさずに痒みを感じない場合がある。

▶ 皮疹

① 疥癬トンネル

② 紅斑性丘疹

③ 結節



図2 疥癬トンネル

(九段坂病院皮膚科・谷口裕子先生提供)

① 疥癬トンネル：手掌、手関節屈側、指間などに好発する。疥癬虫が産卵しながら角層内部を掘り進んでいる現場であるため、虫体、虫卵を検出しやすい。



図3 紅斑性丘疹



図4 結節

(九段坂病院皮膚科・谷口裕子先生提供)

②紅斑性丘疹：体幹（腋窩、胸腹部）・上腕屈側・大腿内側などに好発する、散在性の丘疹ないし小結節。

③結節：男性の外陰部、腋窩、臀部などに多い。



図5 結節に見られた疥癬トンネル(ダーモスコピーによる)



図6 トンネルから検出した疥癬虫と虫卵

疥癬トンネルは、新しい結節にもみられる場合がある。

角化型疥癬



図7 角化型疥癬

免疫能が低下している宿主（重篤な基礎疾患、免疫抑制剤投与中など）に発症する。通常疥癬に対して誤ってステロイド外用を継続した場合にもみられる。

手足、肘頭、膝蓋など物理的刺激を受けやすい部位に灰白色から黄白色の汚いなごらついた角質増殖がみられる。通常疥癬では皮疹がみられない頭部、耳介部などにも症状が現れる。

通常疥癬より寄生している虫の数が圧倒的に多く感染力が強い。

痒みを感じないこともあるので注意を要する。